



Waarschuwingstekst voor producten met Sint-Janskruid

1. Standaard vermelding in de bijsluiter:

Wisselwerking met geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Sint-Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Sint-Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450, waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben.

Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint-Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet.

Dat geldt als u wilt beginnen met Sint-Janskruid te gebruiken, maar ook als u het gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid samen met een van onderstaande geneesmiddelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat middelen met Sint-Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

- remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: ciclosporine;
- antistollingsmiddelen van het coumarine type, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
- anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
- luchtwegverwijders: theofylline;
- hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen: digoxine;
- remmers van het HIV-virus: indinavir.

Sint-Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden.



Bij gelijktijdig gebruik van Sint-Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub-50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap.



Bij het gebruiksvorschrift vermelden:

De aanbevolen dosering niet overschrijden.



Op de buitenkant van de verpakking moet duidelijk vermeld worden:

Dit product kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

2. Indien er geen bijsluiter is een verkorte tekst op het etiket:

Wisselwerking met geneesmiddelen

Dit product kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden.

Overleg met uw arts / apotheker / trombosedienst alvorens dit product te gaan gebruiken of met het gebruik van dit product te stoppen.

Bij het gebruiksvorschrift vermelden:

De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Bovengenoemde tekst is opgesteld door NPN, Neprofarm, NEHOMA, Pharmacon in overleg met het Ministerie van VWS / Keuringsdienst van Waren

Natuur- & gezondheidsProducten Nederland

NPN

Postbus 373

3850 AJ Ermelo

Versie november 2001

